

ENFERMEDADES DEL PISTACHERO y otras alteraciones producidas por agentes abióticos

CENTRO DE INVESTIGACIÓN AGROAMBIENTAL “EL CHAPARRILLO”
CIAG



Castilla-La Mancha
Consejería de Agricultura,
Agua y Desarrollo Rural

Instituto Regional de Investigación y
Desarrollo Agroalimentario y Forestal
de Castilla-La Mancha

IRIAF

Enfermedad	Agente causal
Micosis aéreas	
Marchitez de brotes y panículas	Fam. <i>Botryosphaeriaceae</i>
Septoriosis	<i>Septoria</i> spp.
Alternariosis o necrosis foliar	<i>Alternaria alternata</i>
Marchitez de brotes y flores	<i>Botrytis cinerea</i>
Roya	<i>Pileolaria terebinthi</i>
Micosis del suelo	
Verticilosis	<i>Verticillium dahliae</i>
Podredumbres radicales	<i>Phytophthora</i> spp., <i>Armillaria mellea</i>

VERTICILLOSIS
Verticillium dahliae K.

Verticilosis (*Verticillium dahliae* K.)

- Afecta a numerosas especies vegetales.
- Diferentes cepas que varían en su virulencia y capacidad de infección.
- Puede sobrevivir en suelo en ausencia de hospedantes durante años.
- Se propaga por agua de riego, herramientas, semillas, trasplantes...
- Temperaturas frías y riego excesivo favorece su desarrollo.

Incidencia relacionada con la densidad en suelo

3 $\mu\text{s.g}^{-1}$ es considerado alto riesgo (Trouillas, 2017)



Verticilosis (*Verticillium dahliae* K.)

SÍNTOMAS

Causados por falta de agua - bloqueo haces vasculares.

- **Desecación rápida y muerte de una/s ramas.**

Hojas amarillean, se secan y permanecen adheridas.

- **Desarrollo lento durante varios años.**

Disminución gradual de hojas.

Perdida de vigor.

Reducción del crecimiento y producción.

- **Coloración interna oscura.**

- **Infección severa - muerte del árbol.**



Verticilosis (*Verticillium dahliae* K.)

MEDIDAS DE CONTROL

- **Evitar plantar en zonas infectadas**
- **Elección de portainjertos tolerantes**
- **Plantas libres de infección**
- El **secano y el no laboreo** detienen la propagación
- Evitar cubiertas vegetales susceptibles
- Eliminar hierbas que pueden actuar como huéspedes
- Eliminar ramas afectadas y restos vegetales
- Nutrición equilibrada
- Solarización
- *Trichoderma harzianum*



MARCHITEZ DE BROTES Y PANÍCULAS

Fam. *Botryosphaeriaceae*

Marchitez de brotes y panículas (*Botryosphaeriaceae*)

Botryosphaeria dothidea, *Neofusicoccum mediterraneum*, *Diplodia seriata*...

- Afecta a un amplio rango de hospedantes.
- **Mayor riesgo infección:** Lluvias primaverales - $T^a > 12-15\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- Óptimo: $25-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ y $\uparrow\text{HR}$.
- Patógenos asociados al estrés.



(T. J. Michailides)



(T. J. Michailides)

Marchitez de brotes y panículas (*Botryosphaeriaceae*)

SÍNTOMAS

Primavera - Verano



Marchitez de brotes y panículas (*Botryosphaeriaceae*)

SÍNTOMAS

Verano - Otoño



Marchitez de brotes y panículas (*Botryosphaeriaceae*)

MEDIDAS DE CONTROL

Culturales

- **Saneamiento de las parcelas afectadas.**
- Poda selectiva de racimos y ramas secas y quema de restos de poda.
- Podar árboles infectados en último lugar.
- Desinfección de herramientas de poda.
- **Disminuir humedad ambiental** (poda, malas hierbas).
- Sistemas de riego por goteo o subterráneo.
- Evitar situaciones de stress hídrico en árboles habitualmente regados.

C. Químico

- **Boscalida 26,7% + piraclostrobin 6,7%.**
- El aumento de K en árbol y aplicación de $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$ podría reducir la gravedad.
- Control de chinches.

SEPTORIOSIS
(*Septoria* spp.)

Septoriosis (*Septoria pistaciae*, *S. pistaciarum*, *Pseudocercospora pistacina*, *Cylindroseptoria pistaciae*)

- Enfermedad común en los países productores.
- Lluvias primaverales → factor clave en la epidemiología.
- Las esporas se dispersan por lluvia, riego.
- Lluvias y $T^a > 10\text{ }^{\circ}\text{C}$ → Infecciones primarias. T^a óptima: 23°C .



(T. J. Michailides)



(T. J. Michailides)

Septoria (*Septoria* spp.)

SÍNTOMAS

- Manchas foliares necróticas marrones irregulares
- Lesiones en pecíolos y nerviación de folíolos
- Clorosis y necrosis en zonas afectadas
- Pueden aparecer síntomas en fruto
- Ataques graves: necrosis y defoliación temprana
 - debilitamiento del árbol
 - pérdida de reservas





Septoria (*Septoria* spp.)

MEDIDAS DE CONTROL

Culturales

- Recoger y eliminar las hojas caídas y frutos afectados.
- Los desechos deben quemarse o enterrarse lo antes posible.
- Fertilización equilibrada, evitar exceso de N y falta de K.
- Evitar exceso de riego.

C. Químico

- Tratamientos preventivos a partir de la brotación, tras las lluvias primaverales.

Compuestos cúpricos: **Hidróxido de Cobre.**

ALTERNARIA
(*Alternaria* spp.)

Alternaria (*Alternaria alternata*, *A. arborescens*, *A. tenuissima*)

- Grave en plantaciones con alta HR.
- Tª 15-35°C, óptima 27-30°C.
- Más severa en hojas de ramas con frutos. Años ON > incidencia.
- Susceptibilidad de hojas y frutos aumenta con su madurez.



(T. J. Michailides)

Alternaria (*Alternaria alternata*, *A. arborescens*, *A. tenuissima*)

SÍNTOMAS




(T. J. Michailides)



(T. J. Michailides)



(T. J. Michailides)



(T. J. Michailides)

Alternaria (*Alternaria spp.*)

MEDIDAS DE CONTROL

Culturales

- Mejorar el movimiento del aire mediante poda.
- No recomendable cubiertas vegetales.
- Controlar maleza alta y densa.
- Evitar exceso de riego y usar sistemas adecuados.
- Evitar recolección tardía para minimizar la infección del fruto.


C. químico

- Compuestos a base de cobre:

Oxicloruro de cobre

Sulfato cuprocálcico





FISIOPATÍAS O ALTERACIONES CAUSADAS POR AGENTES ABIÓTICOS

Encharcamiento parcial



Desecación del borde de
las hojas

Marchitez

Asfixia radicular



(F. Trouillas)

Estrés hídrico



(T. J. Michailides)

Acorchado de las hojas



Agotamiento prematuro del árbol o amarilleamiento de las hojas en ramas con frutos



(J.F. Couceiro)

Daños por herbicidas



Deficiencia severa de Boro



(P. García-Estríngana)



(P. García-Estríngana)



(P. García-Estríngana)

Daños por granizo



Desgarro o rotura del fruto, malformación de frutos y rajado del raquis del racimo



Heladas primaverales



(J.F. Couceiro)



(J.F. Couceiro)



(J.F. Couceiro)



Gracias por su atención

María Jesús Cabello Cabello
mjcabello@jccm.es

EL CULTIVO DEL PISTACHO

José Francisco Couceiro López • Julián Guerrero Villaseñor
M.ª Carmen Gijón López • Alfonso Moriana Elvira
David Pérez López • Marina Rodríguez de Francisco

2.ª EDICIÓN



 Vicente Ferrer


Castilla-La Mancha

Consultas técnicas:

jfcouceiro@jccm.es

mjcabello@jccm.es